

La ce să vă așteptați după vaccinări



Acest prospect vă spune despre efectele secundare frecvente ale vaccinărilor care pot apărea la bebeluși și la copiii cu vârsta de până la cinci ani.

După o vaccinare, bebelușul dumneavoastră poate că va plânge puțin, dar se va liniști, de obicei, imediat după ce va fi luat în brațe sau după ce va fi hrănit. Majoritatea copiilor nu au vreo altă reacție.

Reacțiile care apar în locul unde s-a administrat injecția

Unii dintre copii dezvoltă o umflătură, o roșeață sau un nodul mic tare, acolo unde a fost administrată injecția și care poate fi dureros la atingere. Aceasta durează de obicei numai două-trei zile și nu necesită tratament.

Temperaturi

O febră este o temperatură de peste 38° C. Febra este destul de frecventă la copii mici, dar este de obicei, mică. Dacă fața copilului se simte caldă la atingere și dacă este roșu la față sau îmbujorat, atunci el sau ea poate avea febră. Puteți verifica temperatura cu un termometru.

Dacă bebelușul dumneavoastră are febră:

- **nu îl** puneți în cadă
- **nu îl** ștergeți cu buretele
- **nu** puneți ventilatorul pe el

După vaccinarea împotriva MenB (Meningită B)

Se poate aștepta să apară febră după orice vaccinare, dar este foarte frecventă atunci când vaccinul împotriva MenB (Meningită B) este administrat cu celelalte vaccinuri de rutină la două și patru luni. Febra arată că corpul bebelușului răspunde la vaccin, deși chiar dacă nu are febră, nu înseamnă că vaccinul nu a funcționat. Nivelul febrei depinde de fiecare copil în parte și nu indică cât de bine a funcționat vaccinul. Administrarea de paracetamol va reduce riscul de febră, iritabilitate și disconfort general (inclusiv dureri la locul administrării injecției) după vaccinare.

După fiecare vaccinare de la două și de la patru luni, va trebui să administrați copilului dumneavoastră un total de trei doze de paracetamol (2,5 ml de paracetamol pentru copii 120 mg / 5 ml suspensie) pentru a preveni și trata orice febră potențială. Trebuie să administrați prima doză de paracetamol cât mai curând posibil după vizita pentru administrarea vaccinului pentru vârsta de două luni. Ar trebui să administrați a doua doză la un interval de patru până la șase ore mai târziu, iar a treia doză la un interval de patru până la șase ore, după aceasta. Va trebui să urmați aceiași pași după vaccinările pentru vârsta de patru luni. Asistenta dumneavoastră vă va oferi mai multe informații despre paracetamol la programarea pentru vaccinare și vi se

Dacă nu aveți paracetamol lichid pentru sugari la domiciliu, ar trebui să îl procurați în timp util pentru prima vizită de vaccinare. Este disponibil la scară largă de la farmacii și supermarketuri.

poate oferi un prospect cu instrucțiuni scrise pentru a îl lua cu dumneavoastră.

După vaccinarea împotriva MMR (a rujeolei, oreionului și a rubeolei)

MMR este alcătuit din trei vaccinuri diferite (rujeola, oreion și rubeolă) și acestea pot provoca fiecare reacții la diferite momente după administrarea injectiei.

După șase până la zece zile, vaccinul împotriva rujeolei începe să funcționeze și poate provoca febră, o erupție cutanată asemănătoare rujeolei și pierderea apetitului. Persoanele care dezvoltă simptome asociate vaccinului nu sunt contagioase pentru ceilalți.

Timp de două până la trei săptămâni după administrare, vaccinul împotriva oreionului poate provoca simptome asemănătoare cu oreionul la unii copii (febră și ganglioni umflați).

Vaccinul împotriva rubeolei poate provoca o erupție cutanată scurtă și, eventual, o temperatură ușor crescută, cel mai frecvent în jur de 12 până la 14 zile după administrare, dar o erupție cutanată poate apărea, de asemenea rar, până la șase săptămâni mai târziu.

Dacă sunteți îngrijorat/ă în privința copilului dumneavoastră, aveți încredere

Țineți minte să nu administrați niciodată medicamente care conțin aspirină copiilor cu vârsta sub 16 ani.

în instinctele dumneavoastră. Vorbiți cu medicul dumneavoastră sau sunați la NHS la numărul **111**.

Apelați imediat la medic dacă, la orice moment, copilul dumneavoastră are o temperatură de 39-40 ° C sau mai mare sau dacă are o criză.

Dacă policlinica este închisă și nu puteți contacta medicul, aveți încredere în instinctele dumneavoastră și mergeți la cel mai apropiat spital cu un departament de urgență.

Dacă, după ce ați citit acest prospect, încă nu sunteți mulțumit de reacția bebelușului dumneavoastră la orice vaccinare, adresați-vă asistentei medicale sau medicului de familie.

Verificarea siguranței vaccinului

Înainte de introducerea vaccinurilor, acestea trebuie să fie autorizate de către Agenția de Reglementare a Produselor Medicale și Sănătate care evaluează siguranța și eficacitatea lor.

Odată ce au fost introduse în program, siguranța lor continuă să fie monitorizată constant, astfel încât orice efecte secundare noi să fie observate rapid și investigate.

Dacă doriți mai multe informații despre siguranța vaccinurilor, vă rugăm vizitați www.mhra.gov.uk

Mai multe informații

Dacă doriți mai multe informații despre efectele secundare ale vaccinurilor și ale vaccinărilor, vă rugăm să luați prospectul *A guide to immunisations up to 13 months of age* (Un ghid pentru imunizări până la vârsta de 13 luni) de la policlinica dumneavoastră sau accesați NHS Choices www.nhs.uk.

