



Повний календар планових профілактичних щеплень

Від вересня 2024 року

Належний вік	Від яких хвороб захищає	Надана вакцина та її торговельна назва		Звичайне місце введення ¹
Вісім тижнів	Дифтерія, правець, коклюш (кашлюк), поліомієліт, гемофільна інфекція типу b (Hib) та гепатит B	DTaP/IPV/Hib/НерВ	Infanrix hexa або Vaxelis	Стегно
	Менінгокок групи В (MenB)	MenB	Bexsero	Ліве стегно
	Ротавірусний гастроентерит	Ротавірус ²	Rotarix ²	Через рот
Дванадцять тижнів	Дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, Hib та гепатит B	DTaP/IPV/Hib/НерВ	Infanrix hexa або Vaxelis	Стегно
	Пневмокок (13 серотипів)	Пневмококова кон'югована вакцина (PCV)	Prevenar 13	Стегно
	Ротавірус	Ротавірус ²	Rotarix ²	Через рот
Шістнадцять тижнів	Дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, Hib та гепатит B	DTaP/IPV/Hib/НерВ	Infanrix hexa або Vaxelis	Стегно
	MenB	MenB	Bexsero	Ліве стегно
Один рік (в день, коли дитині виповниться рік, чи після цього)	Hib та MenC	Hib/MenC	Menitorix	Плече/стегно
	Пневмокок	Бустер PCV	Prevenar 13	Плече/стегно
	Кір, паротит і краснуха	MMR	MMRvaxPro ³ або Priorix	Плече/стегно
	MenB	Бустер MenB	Bexsero	Ліве стегно
Відповідні вікові групи дітей ⁴	Грип (щороку з вересня)	Жива послаблена вакцина проти грипу LAIV ^{3,6}	Fluenz ^{3,6}	Обидві ніздрі
Три роки чотири місяці або незабаром після цього	Дифтерія, правець, коклюш та поліомієліт	dTaP/IPV	Boostrix-IPV	Плече
	Кір, паротит і краснуха	MMR (перевірте, що першу дозу надано)	MMRvaxPro ³ або Priorix	Плече
Хлопчики та дівчатка віком від дванадцяти до тринадцяти років	Рак і генітальні бородавки, спричинені певними типами вірусу папіломи людини (HPV)	HPV ⁵	Gardasil 9	Плече
Чотирнадцять років (9-ий клас)	Правець, дифтерія та поліомієліт	Td/IPV (перевірте статус MMR)	Revaxis	Плече
	Менінгокок груп А, С, W та Y	MenACWY	MenQuadfi	Плече
65 років	Пневмокок (23 серотипи)	Пневмококова полісахаридна вакцина (PPV23)	Pneumovax 23	Плече
65 років і старше	Грип (щороку з вересня)	Інактивована вакцина проти грипу	Множинні вакцини	Плече
65 років з вересня 2023 р. ⁷	Оперізуючий лишай	Вакцина проти оперізуючого лишая	Shingrix	Плече
Від 70 до 79 років (плюс відповідні вікові групи та люди з важкою імуносупресією) ⁷	Оперізуючий лишай	Вакцина проти оперізуючого лишая	Zostavax ^{3,7} (або Shingrix, якщо Zostavax протипоказаний)	Плече
	75 років	Респіраторно-синцитіальний вірус (RSV)	Вакцина проти RSV	Abrysvo

1. Внутрішньом'язова ін'єкція в дельтоподібний м'яз плеча або передньо-латеральну частину стегна.
 2. Вакцину проти ротавірусної інфекції слід вводити тільки після перевірки результату скринінгу на важкий комбінований імунodefіцит (SCID).
 3. Містить свинячий желатин.
 4. Див. щорічну листівку про грип за посиланням: www.gov.uk/government/collections/annual-flu-programme
 5. Див. докладніше в розділі 18а «HPV» Зеленої книги (Green Book) про імунізацію молодих людей із ослабленим імунітетом, яким потрібно 3 дози.

6. Якщо LAIV (жива послаблена вакцина проти грипу) протипоказана або не підходить з інших причин, використовуйте інактивовану вакцину проти грипу (див. докладніше в розділі 19 Зеленої книги (Green Book)).
 7. Див. докладніше в розділі 28а «Оперізуючий лишай» Зеленої книги (Green Book) про відповідні вікові групи, включаючи людей з важкою імуносупресією від 50 років.



Інформацію про забезпечення вакцин для планових щеплень можна знайти на сайті portal.immform.phe.gov.uk, а всю іншу інформацію про забезпечення вакцин можна знайти в розділі «Оновлення вакцин»: www.gov.uk/government/collections/vaccine-update

Програми вибіркового профілактичного щеплення

Цільова група	Вік та календар щеплень	Хвороба	Потрібні вакцини
Діти, народжені від матерів, інфікованих гепатитом В	При народженні, у чотири тижні та в 12 місяців ^{1,2}	Гепатит В	Гепатит В (Engerix B/НВvaxPRO)
Немовлята в регіонах країни з захворюваністю на туберкульоз $\geq 40/100\ 000$	Приблизно у віці 28 днів ⁴	Туберкульоз	BCG
Немовлята з одним із батьків, бабусею чи дідусем, народженими в країні з високим рівнем захворюваності ³	Приблизно у віці 28 днів ⁴	Туберкульоз	BCG
Діти в групі клінічного ризику	3-6 місяців до 17 років	Грип	LAIV чи інактивована вакцина проти грипу, якщо є протипоказання до LAIV або у віці до 2 років
Вагітні жінки	На будь-якому етапі вагітності в сезон грипу	Грип	Інактивована вакцина проти грипу
	Від 16 тижня вагітності ⁵	Коклюш	Tdap (ADACEL)
	Від 28 тижня вагітності	RSV	Вакцина проти RSV (Abrysvo)

1. Перевірте кров на HBsAg у 12 місяців, щоб виключити зараження.
2. Додатково вводиться гексавалентна вакцина (Infanrix hexa або Vaxelis) у віці 8, 12 та 16 тижнів.
3. Якщо щорічна захворюваність на туберкульоз $\geq 40/100\ 000$ – див. www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people

4. Перевірте результат скринінгу на SCID, перш ніж вводити BCG.
5. Оптимально до 32 тижня вагітності, але можна давати після 32 тижня.

Додаткові вакцини для осіб із основним медичним станом

Медичний стан	Від яких хвороб захищає	Потрібні вакцини ¹
Аспленія або дисфункція селезінки (в тому числі внаслідок серповидно-клітинної анемії та целіакії)	Менінгокок груп А, В, С, W та Y Пневмокок Грип	MenACWY MenB PCV13 (до 10 років) ² PPV23 (від 2 років) Щорічна вакцина проти грипу
Кохлеарні імпланти	Пневмокок	PCV13 (до 10 років) ² PPV23 (від 2 років)
Хронічні респіраторні та серцеві захворювання (наприклад, важка астма, хронічна хвороба легень та серцева недостатність)	Пневмокок Грип	PCV13 (до 10 років) ² PPV23 (від 2 років) Щорічна вакцина проти грипу
Хронічні неврологічні захворювання (наприклад, хвороба Паркінсона чи моторних нейронів або нездатність до навчання)	Пневмокок Грип	PCV13 (до 10 років) ² PPV23 (від 2 років) Щорічна вакцина проти грипу
Діабет	Пневмокок Грип	PCV13 (до 10 років) ² PPV23 (від 2 років) Щорічна вакцина проти грипу
Хронічна хвороба нирок (СКД) (включаючи гемодіаліз)	Пневмокок (4 та 5 стадії СКД) Грип (3, 4 та 5 стадії СКД) Гепатит В (4 та 5 стадії СКД)	PCV13 (до 10 років) ² PPV23 (від 2 років) Щорічна вакцина проти грипу Гепатит В
Хронічні захворювання печінки	Пневмокок Грип Гепатит А Гепатит В	PCV13 (до 10 років) ² PPV23 (від 2 років) Щорічна вакцина проти грипу Гепатит А Гепатит В
Гемофілія	Гепатит А Гепатит В	Гепатит А Гепатит В
Імуносупресія через хворобу або лікування ⁴	Пневмокок Вакцина проти оперізуючого лишая Грип	PCV13 (до 10 років) ^{2,3} PPV23 (від 2 років) Shingrix – старше 50 років ⁵ Щорічна вакцина проти грипу
Порушення функції комплементу (включаючи тих, хто отримує терапію інгібіторами комплементу)	Менінгокок груп А, В, С, W та Y Пневмокок Грип	MenACWY MenB PCV13 (до 10 років) ² PPV23 (від 2 років) Щорічна вакцина проти грипу

1. Див. конкретний календар у відповідному розділі Зеленої книги: www.gov.uk/government/collections/immunisation-against-infectious-disease-the-green-book
2. Дітям віком від 2 до 10 років, неімунізованим або частково імунізованим проти пневмокової інфекції, введіть одну дозу вакцини PCV13.
3. У будь-якому віці з важкою імуносупресією.

4. Розгляньте можливість щорічної вакцинації проти грипу для членів домогосподарства і тих, хто доглядає за людьми з цими медичними станами.
5. Див. в розділі 28а «Оперізуючий лишай» Зеленої книги (Green Book) www.gov.uk/government/publications/shingles-herpes-zoster-the-green-book-chapter-28a