




UK Health
Security
Agency



Cum să vă protejați copilul de RSV

Un ghid pentru vaccinul
împotriva virusului respirator
sincitial (RSV) pentru femeile
însărcinate



Începând cu septembrie 2024, femeile însărcinate pot beneficia de un vaccin gratuit la fiecare sarcină, pentru a proteja bebelușii împotriva virusului respirator sincitial (RSV).

De ce trebuie să protejăm bebelușii de RSV?

Virusul respirator sincițial, sau RSV, este un virus comun care poate provoca o infecție pulmonară numită bronșiolită. La bebelușii mici, această afecțiune poate face ca respirația și hrânirea să fie dificile. Majoritatea cazurilor pot fi tratate la domiciliu, însă aproximativ 20.000 de sugari sunt spitalizați cu bronșiolită în fiecare an în Anglia. Bebelușii cu bronșiolită severă pot necesita îngrijiri intensive, iar infecția poate fi fatală. Afectiunea RSV este probabil mai gravă la copiii foarte mici, la cei născuți prematur și la cei cu afecțiuni ale inimii, respirației sau sistemului imunitar.

Infecțiile cu RSV pot apărea pe tot parcursul anului, dar cazurile ating un apogeu în fiecare iarnă.

Cum se răspândește RSV?

RSV este foarte infecțios și se răspândește ușor, în special în rândul copiilor, prin tuse și strănut. Chiar și cu măsuri simple, cum ar fi spălarea mâinilor și acoperirea gurii și a nasului la strănutat, este dificilă evitarea răspândirii infecției în familie. Cel mai bun mod de a vă proteja copilul împotriva infecției cu RSV este ca dvs. să vă faceți vaccinul în timpul sarcinii.

Cât de eficient este vaccinul RSV?

Vaccinul vă stimulează sistemul imunitar pentru a produce mai mulți anticorpi împotriva virusului. Acești anticorpi trec apoi prin placenta, pentru a ajuta la protejarea bebelușului dumneavoastră de la naștere. Vaccinarea împotriva RSV reduce riscul de bronșiolită severă cu 70% în primele 6 luni de viață.

După această vîrstă, bebelușul dumneavoastră prezintă un risc mult mai scăzut de fi afectat grav de RSV.

Copiii mai mari și adulții pot contracta, de asemenea, infecția cu RSV, dar boala este mai gravă pentru bebeluși și pentru persoanele peste 75 de ani.

Când ar trebui să mă vaccinez?

Acest vaccin ar trebui să vă fie oferit aproximativ la data programării prenatale din săptămâna 28. Dacă nu sunteți contactată până la momentul respectiv, sunați la maternitate sau la medicul de familie, pentru o programare. Vaccinarea în săptămâna 28 sau câteva săptămâni mai târziu, vă ajută să obțineți un nivel bun de anticorpi pe care să îi transmită copilului dumneavoastră înainte de naștere. Astfel, copilul va beneficia de cea mai bună protecție, inclusiv dacă se naște prematur.

Puteți să vă faceți vaccinul și mai târziu în timpul sarcinii, dar acesta poate fi mai puțin eficient. Dacă nu a fost posibil să vă faceți vaccinul mai devreme, acesta poate fi administrat până la nașterea copilului. Dacă îl faceți foarte târziu în timpul sarcinii, vă poate totuși proteja împotriva infecției și reduce riscul de transmitere al infecției la noul-născut.

Cum se administrează și care sunt efectele secundare?

Vaccinul este o singură injecție în antebraț.

Efectele secundare sunt de obicei ușoare.

Acestea includ:

- dureri de cap
- dureri musculare
- durere, roșeață sau umflătură la locul injecției

Vaccinul RSV în timpul sarcinii este sigur pentru copilul meu?

Vaccinul a fost studiat în cadrul unor studii clinice efectuate pe aproximativ 4.000 de femei și a fost administrat multor mii de femei, în cadrul unor programe naționale. Monitorizarea în SUA, unde a fost administrat la peste 100.000 de femei, a arătat un profil de siguranță bun. În cadrul studiului clinic principal, în luna de după vaccinare, au existat ceva mai mulți copii prematuri în grupul vaccinat (2,1%) decât în grupul nevaccinat (1,9%). Această diferență este cel mai probabil să fie cauzată de șansă. Vaccinul a fost aprobat de autoritățile de reglementare a medicamentelor din Regatul Unit, Europa și SUA, din punct de vedere al protecției, calității și siguranței.

Vaccinarea înseamnă că bebelușul meu nu va contracta RSV?

S-a demonstrat că, vaccinul reduce şansele ca bebelușul dumneavoastră să se îmbolnăvească grav de RSV. La fel ca toate medicamentele, niciun vaccin nu este complet eficient, iar unii bebeluși pot contracta în continuare infecția cu RSV, deși mamele lor au fost vaccinate. Însă, pentru majoritatea copiilor născuți de mame vaccinate, orice infecție cu RSV ar trebui să fie mai puțin gravă.

Puteți citi broșura de informare pentru vaccinul RSV numit Abrysvo aici: www.medicines.org.uk/emc/product/15309/pil

Ce se întâmplă dacă bebelușul meu prezintă un risc mai mare?

Unii bebeluși care prezintă un risc mai mare de RSV, cum ar fi cei foarte prematuri, cei cu boli cardiace grave, sau cei cu imunitate redusă, pot primi și o injecție cu anticorpi. Această injecție le va oferi o protecție suplimentară, în plus față de anticorpii primiți de la mamă.

Trebuie să fac vaccinul RSV la fiecare sarcină?

Da, ar trebui să-l faceți la fiecare sarcină, pentru a-i oferi bebelușului dumneavoastră cea mai bună protecție.

Pot să-mi fac celelalte vaccinuri materne în același timp cu vaccinul împotriva RSV?

Este important să vă faceți vaccinurile la momentul potrivit în timpul sarcinii:

- vaccinul împotriva tusei convulsive se administrează de obicei mai devreme în timpul sarcinii (în jurul datei examinării la mijlocul sarcinii, de obicei la 20 de săptămâni)
- ar trebui să vă faceți vaccinul RSV la 28 de săptămâni de sarcină
- vaccinul antigripal poate fi administrat în orice stadiu al sarcinii. Ar trebui să vi-l administrați de îndată ce vă este disponibil.

Când sunteți chemată pentru vaccinul RSV, dacă nu v-ați făcut încă vaccinurile împotriva tusei convulsive sau a gripei, atunci ar trebui să le faceți în același timp.

Unde pot obține mai multe informații?

Puteți discuta cu moașa dumneavoastră sau cu medicul de familie și puteți citi această broșură online aici:

www.gov.uk/government/publications/respiratory-syncytial-virus-rsv-maternal-vaccination

www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/vaccinations

Pentru mai multe informații despre vaccinurile care vă vor fi oferite atunci când sunteți însărcinată, puteți consulta site-ul:

www.gov.uk/government/publications/pregnancy-how-to-help-protect-you-and-your-baby

Copilul meu ar putea avea bronșiolită RSV?

Simptomele bronșiolitei RSV pot include:

- nas înfundat sau secreție nazală
- respirația este dificilă, rapidă sau zgomotoasă (fornăit)
- dificultăți de hrănire
- tuse
- febră
- este agitat, sau greu de liniștit
- oboseală sau letargie

RSV poate provoca și alte afecțiuni la copiii mici, cum ar fi angina difterică și o infecție dureroasă în interiorul urechii (otită medie).



Puteți raporta efectele secundare suspectate pe site-ul web Yellow Card, sau apelând linia telefonică gratuită

0800 731 6789 (de luni până vineri, de la 9:00 la 17:00), sau descărcând aplicația Yellow Card.

www.mhra.gov.uk/yellowcard

Solicitați o programare urgentă la medicul de familie, sau sunați la 111, dacă:

- copilul dumneavastră a răcit și situația se agravează
- copilul dumneavastră se hrănește sau mănâncă mult mai puțin decât în mod normal
- copilul dumneavastră a avut scutecul uscat timp de 12 ore sau mai mult, sau prezintă alte semne de deshidratare
- bebelușul dumneavastră are sub 3 luni și are o temperatură de 38°C, sau are mai mult de 3 luni și are o temperatură de 39°C sau peste

Sunați la 999 sau mergeți la Urgențe dacă:

copilul dvs. pare să se simtă foarte rău, aveți încredere în propria judecată. Ar trebui să acționați dacă:

- copilul dumneavastră are dificultăți de respirație - este posibil să observați fornărituri, sau pieptul și burtica sunt aspirate înăuntru, între coastele bebelușului sau chiar sub coaste
- există pauze la respirație
- pielea, limba sau buzele copilului dumneavastră sunt albastre
- copilul dumneavastră este moale și nu se trezește, sau nu poate sta treaz

